



โรคฝีดาษลิง



โรคฝีดาษลิง เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส orthopoxvirus เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนที่พบได้น้อย โรคนี้พบมากในแอฟริกากลาง และตะวันตก มักพบในสัตว์ตระกูลลิง และสัตว์ฟันแทะหลายชนิด เช่น หนู กระรอก กระต่าย เป็นต้น

ติดต่อในมนุษย์ได้อย่างไร

ติดต่อจากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สังกัดหลัง หรือ ตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื้อ หรือจากการถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัด



อาการของโรคฝีดาษลิง

1. มีไข้ หนาวสั่น
2. ปวดหัว เจ็บคอ ต่อม้ำท่อน้ำเหลืองโต
3. ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง
4. อ่อนเพลีย
5. 1-3 วัน จะมีผื่นขึ้น
6. จากผื่น จะกลายเป็นตุ่มหนอง



อาการป่วยโรคฝีดาษลิง
ในคนจะค่อยๆหายได้เองหลังจากผ่านไปประมาณ 2-4 สัปดาห์แต่หากอาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์ เพื่อตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพิ่มเติม



โรคฝีดาษลิง

โรคสุสวัด

Pox virus

เชื้อก่อโรค

Varicella zoster Virus

- การสัมผัสสารคัดหลั่ง รอยโรค และละอองฝอยจากทางเดินหายใจ
- ติดต้อจากสัตว์สู่มนุษย์
- ติดต้อจากมนุษย์สู่มนุษย์

การติดต้อ

- มักเกิดจากการเป็นโรคสุกใสมาก่อน และมีเชื้อหลบที่ปมประสาท จะแสดงอาการภายหลัง
- สารคัดหลั่งของผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อได้



7 - 21 วัน

ระยะฟักตัว

กรณีสัมผัสสารคัดหลั่ง 10-21 วัน



ไข้ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย
ปวดหลัง ต่อม้ำเหลืองโต

อาการนำ

อาการเจ็บ ปวดแสบร้อน
คัน บนตำแหน่งที่จะเกิด
รอยโรค อาจมีไข้ต่ำ ๆ
ปวดเมื่อยเนื้อตัว ปวดศีรษะ



- แผลในปาก ตามด้วยผื่นแดง ตุ่มแดง ตุ่มน้ำ โดยตุ่มน้ำอาจมีรอยนูนเล็ก ๆ ตรงกลางและกลายเป็นตุ่มหนอง แล้วจึงตกสะเก็ด
- รอยโรคจะอยู่ในระยะเดียวกัน

อาการแสดงทางผิวหนัง

- ตุ่มแดง และตุ่มน้ำที่เจ็บ อาจจะมีรอยนูนเล็ก ๆ ตรงกลาง ต่อมากลายเป็นตุ่มหนองและแผล หรือแผลลอกตกสะเก็ด
- รอยโรคจะอยู่เป็นกลุ่ม และมีการกระจายตัวตามแนวของเส้นประสาท



แบบประคับประคองและรักษาตามอาการ ยาต้านไวรัส tecovirimat (อยู่ระหว่างการศีกษา)

การรักษา


รักษาตามอาการร่วมกับยาต้านไวรัส เช่น acyclovir, famciclovir, valacyclovir



ฝีดาษชวานร... ป้องกันได้



ล้างมือบ่อยๆ



เว้นระยะห่าง



เสี่ยงมีเพศสัมพันธ์
กับคนที่ไม่รู้จัก



ไม่ใช้ของส่วนตัว
ร่วมกับผู้อื่น



เสี่ยงใกล้ชิด
กับผู้ป่วยที่มีตุ่มหนอง



กินอาหารปรุงสุก



สงสัยว่าป่วย ควรพบแพทย์ทันที

ทุกคนยังต้องป้องกันตัวเองอยู่เสมอเนะ

