



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ยุงกัด เสี่ยงโรค



ยุงลาย

เสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออก
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ ชิคุนกุนยา

ยุงลาย ลำตัวและขามีลายสีทึบดำ
พบได้ทั่วไป เช่น บ้านเรือน หรือบริเวณแหล่งเพาะพันธุ์
ที่เป็นภาชนะที่มีน้ำขัง

แต่ละครั้ง อะไรบ้าง?



ยุงรำคาญ

เสี่ยงเป็นโรคไข้สมองอักเสบ

ยุงรำคาญ ลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อน
พบได้บริเวณ : ทุ่งนา หรือบริเวณรอยเท้าสัตว์ที่มีน้ำขัง

ยุงก้นปล่อง



เสี่ยงเป็นโรคมาลาเรีย

ยุงก้นปล่อง ลำตัวมีขนาดเล็ก สีดำ
เกาะทำมุม 45 องศา กับพื้นผิว

พบได้บริเวณ : ป่าเชิงเขา หรือบริเวณลำธาร
น้ำใส ไหลรินเอื่อยๆ หากินเวลากลางคืน

ยุงเสือ/ยุงลายเสือ



เสี่ยงเป็นโรคเท้าช้าง

ยุงเสือ/ยุงลายเสือ ลำตัวมีสีน้ำตาล ปีกมีสีงาวสลับน้ำตาล

พบได้บริเวณ : บึง หนองน้ำที่มีวัชพืช และพืชน้ำต่างๆ



รู้ทันโรคแมลง



สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422